

Gebühr frei		Krankenkasse bzw. Kostenträger	
Geb.-plf.		Name, Vorname des Versicherten	
noctu		geb. am	
Sonstige		Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.
Unfall		Status	
Arbeitsunfall		Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.
		Datum	

Verordnung RECAcare Analtampon

Hilfsmittelverzeichnis Nr. 15.25.17.0003 + 0004 € 0197



Verordnungszeitraum:

Bitte ankreuzen:	Stückzahl:	PZN:
<input type="checkbox"/> RECAcare Test Set (zur Erprobung, inkl. Einführstab)	1 St.	01350877
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 20/3	50 St.	02421183
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 20/3	100 St.	08643453
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 20/4	50 St.	02421208
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 20/4	100 St.	08643476
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 40/24	50 St.	02075692
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 40/24	100 St.	02075700
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 40/30	50 St.	02075717
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 40/30	100 St.	02075723
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 40/35	50 St.	02075746
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 40/35	100 St.	02075752
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 44/24	50 St.	02075769
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 44/24	100 St.	02075775
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 44/35	50 St.	02075781
<input type="checkbox"/> RECAcare Tampon Art. Nr. 44/35	100 St.	02075798
<input type="checkbox"/> RECAcare Einführstab Art. Nr. 30/1	1 St.	

Der Patient benötigt **RECAcare** Analtampons aufgrund von Stuhlinkontinenz wegen:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> permanenter Schließmuskelschwäche | <input type="checkbox"/> Querschnittslähmung |
| <input type="checkbox"/> Dekubitus oder Dekubitusprophylaxe | <input type="checkbox"/> Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa |
| <input type="checkbox"/> Unterstützung für Sphinktertraining | <input type="checkbox"/> Schlaganfall, MS, Diabetes |
| <input type="checkbox"/> Meningomyelozele (Spina bifida) | <input type="checkbox"/> Operations- oder Strahlungsschäden |
| <input type="checkbox"/> Alzheimer | |

Da es durch diese Erkrankung zu unkontrollierten Stuhlentleerungen kommt, ist der Gebrauch von **RECAcare** Analtampons erforderlich. Mit deren Hilfe kann der Patient jeweils für mehrere Stunden kontinent und sauber bleiben. Die durch Stuhlinkontinenz entstehenden psychischen Probleme werden gemindert und Ausscheidungen können wieder kontrolliert werden. Die Gefahr von Dekubitusgeschwüren wird verringert und die Pflege des Betroffenen erleichtert.

.....
Datum, Stempel, Unterschrift des Arztes